

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela de Tecnología Medica - Terapia Fisica y Rehabilitacion



**Factores de riesgo predisponentes en accidente cerebrovascular isquémico en
el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital III Essalud
Chimbote - 2016.**

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Tecnología Medica con Especialidad en Terapia Fisica
y Rehabilitacion

Elaborado por :

CAVERO CORTEZ JOSHELYN BRIGGITTE

CHIMBOTE

2016

Resumen

El presente trabajo de investigación titulado “Factores de riesgo predisponentes de ACV isquémico en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital III EsSalud, Chimbote 2016”, teniendo como objetivo principal determinar los factores de riesgo predisponentes en ACV isquémico en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital III EsSalud, Chimbote 2016. Siendo una investigación de tipo y diseño descriptivo, no experimental, de corte transversal. Fue aplicada a una población de 80 pacientes entre edades de 45 a 70 años con el diagnóstico de ACV isquémico en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital III EsSalud Chimbote. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS Statistics y Office Excel Microsoft 2013. El instrumento utilizado para la medición de la variable fue la Ficha de Evaluación de Lesiones Centrales del Programa de Neurológico del Hospital III EsSalud Chimbote, a su vez se empleó una encuesta que fue aplicada con el consentimiento de los pacientes de dicho servicio. Los resultados obtenidos del estudio, los factores de riesgo predisponentes según el grupo etareo con mayor incidencia de ACV Isquémico son entre las edades de 70 a 75 años, concluyendo con esto que las personas a mayor edad están propensas a sufrir de un accidente cerebrovascular, a su vez puede dejar secuelas como parálisis, déficit de la coordinación motora, déficit cognoscitivo, problema del habla, dificultades emocionales y trastornos sensitivos, los que pueden generar problemas en las actividades de la vida diaria. Según el factor de riesgo con mayor prevalencia la hipertensión arterial es el factor de riesgo potencialmente modificable con mayor frecuencia, teniendo un porcentaje de 40% sobre la muestra, como segundo lugar con el 30% se define al hipercolesterolemia, y considerando un tercer lugar con 25% un ECV previo. La población masculina es la más afectada, teniendo a 48 pacientes considerados dentro de la muestra de estudio entre las edades de 60 a 70 años con un porcentaje de 60%.