

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD**  
**Escuela de Obstetricia**



**Factores asociados a las complicaciones obstétricas en gestantes añosas,**  
**Hospital Nacional P.N.P. Luis N. Sáenz 2015**

Tesis para optar el Título Segunda Especialidad Profesional de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN  
OBSTETRICIA EN EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS EN OBSTETRICIA

Elaborado por :

CARDENAS RODRIGUEZ JACQUELINE ILIANA

LIMA

2016

## Resumen

En Hospital Nacional de la PNP "Luis N. Sáenz", en los últimos años se viene observando un buen número de gestantes mayores de 35 años entre sus usuarias, lo que ha generado el interés ya que son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como gestantes de alto riesgo. Por lo que se planteó como objetivo general el de determinar los factores más frecuentes que se asocian a las complicaciones obstétricas en gestantes añosas en el Hospital Nacional de la PNP. "Luis N. Sáenz" 2015, la metodología empleada fue de tipo descriptivo, retrospectivo, de diseño no experimental, transversal de campo. La población empleada fueron todas las gestantes mayores de 35 años atendidas en el servicio de obstetricia, que culminaron su embarazo en parto, entre julio a diciembre del 2015. Y la muestra se tomó del registro de un total de 150 historias clínicas de gestantes mayores de 35 años que cumplieron con los criterios de inclusión e exclusión de las cuales 50 tuvieron complicaciones obstétricas, y 100 no tuvieron complicaciones obstétricas, siendo una muestra no probabilística de tipo incidental. El instrumento que se utilizó fue el aplicado en el trabajo de investigación de Olortegui L. (2013). Como resultados se obtuvo que los indicadores: evaluación nutricional, controles prenatales, consumo de alcohol, consumo de tabaco, edad gestacional y paridad; son factores de riesgo más frecuentes que se asocian a las complicaciones obstétricas. Los factores individuales asociados a las complicaciones obstétricas en las gestantes añosas son: la evaluación nutricional con el predominio en el sobrepeso, la mayoría de gestantes tuvo más de 7 controles prenatales, no presentaron consumo alcohol, y como antecedente patológico se encontró un predominio de hipertensión arterial. La edad gestacional predomina entre 28 a 36 semanas, gestantes multíparas, con periodo intergenésico entre 25 a 48 meses, y la presencia de óbito fetal y embarazo ectópico. Y las complicaciones obstétricas más frecuentes en las gestantes añosas son la presencia atonía, hipotonía uterina y la anemia moderada o severa.