

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



**FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y NEONATALES EN SEPSIS
NEONATAL, HOSPITAL LA CALETA-CHIMBOTE 2015-2017**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

ZANABRIA CAYA CAROLINA

CHIMBOTE

2018

Resumen

La sepsis neonatal temprana es una infección sistémica producida por bacterias, hongos o virus que ocurre durante el período neonatal, estudios consultados ponen en evidencia que existen condiciones que favorecen la aparición de sepsis neonatal temprana, en estos estudios las condiciones más frecuentes reportadas son la prematuridad, la rotura prematura de membrana y la corioamnionitis. Ante esta evidencia se realizó el presente estudio con diseño caso – control en 68 casos y 68 controles, el cual tuvo como objetivo principal determinar si la corioamnionitis, la ruptura prematura de membrana y la prematuridad son factores de riesgo para sepsis neonatal temprana. Se reportó que la ruptura prematura de membranas presentó un OR multivariado de 4,407 con un IC al 95% de 1,84 a 10,58; la corioamnionitis presentó un OR multivariado de 3,813 con un IC al 95% de 1,564 a 9,299. Se concluye que: la rotura prematura es un factor de riesgo para sepsis neonatal, la corioamnionitis es un factor de riesgo para sepsis neonatal. No fue posible determinar al análisis multivariado que la prematuridad fuera un factor de riesgo.