

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



**"RELACION ENTRE LA EDAD MATERNA Y LA MORBILIDAD
NEONATAL EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LA
CALETA, CHIMBOTE - PERU, EN EL AÑO 2017"**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

ZELADA GARAY JORGE JESÚS

CHIMBOTE

2018

Resumen

Propósito: Se realizó un estudio con la finalidad de determinar la relación entre la edad materna y la morbilidad neonatal. **Metodología:** El tipo de investigación fue cuantitativo, aplicada, transversal, con un diseño descriptivo-correlacional, para el presente estudio se revisaron las historias clínicas de los recién nacidos en el hospital La Caleta en el año 2017. El total de nacimientos de neonatos, de madres de 10-35 en dicho año fue de 1703 y la muestra fue de 160 neonatos de madres adolescentes y de madres adultas. La información obtenida fue registrada con el software Microsoft Excel, para luego ser procesada con el programa SPSS v21 en el cual se elaboraron tablas de frecuencia y de contingencia; y se aplicó odds ratio y la prueba de diferencia de proporciones, Chi Cuadrado (CC), respectivamente. **Resultados:** En el presente estudio el 21% de la población correspondió hijos de madres adolescentes; la edad gestacional, evaluada por Capurro se obtuvo que el 7,5% de los neonatos de madres adolescentes fueron prematuros (CC: 3,372). En cuanto al peso al nacer, se obtuvo que el 5% de los neonatos de madres adolescentes tuvieron bajo peso al nacer (CC: 2,831); en la sepsis neonatal se encontró que el 7,5% de los neonatos de madres adolescentes presentaron dicha morbilidad (CC: 3,372); en la sepsis neonatal se encontró que el 7,5% de los neonatos de madres adolescentes presentaron dicha morbilidad (CC: 3,372); en el Apgar al 5', se encontró que el 2,5% de los neonatos de madres adolescentes presentaron Apgar bajo (CC: 0,675). En el síndrome de dificultad respiratoria, evaluada por el test de Silverman y Anderson, se encontró que el 7,5% de los neonatos de madres adolescentes presentaron dicha morbilidad (CC: 1,245). En cuanto a la morbilidad neonatal en general, se encontró que el 27,5% de los neonatos de madres adolescentes presentaron morbilidad (CC: 12,442). **Conclusiones:** Se estableció que si existe relación entre la edad materna y la morbilidad neonatal en pacientes atendidos en el hospital La Caleta en el año 2017.