

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



**Factores asociados al abandono de la lactancia materna
exclusiva y madres que asisten al consultorio cred
Hospital II-2 Sullana, diciembre 2016-abril 2017.**

Tesis para obtener el Título Profesional de LICENCIADO EN ENFERMERÍA

Autor

Tavara Armestar, Maria Austragilda

Sullana – Perú
2018

ABSTRACT

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres que asisten al Consultorio CRED del Hospital de Apoyo Il Sullana de Diciembre 2016 a Abril 2017. Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue de 39 madres de menores de seis meses. La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento un cuestionario elaborado, validado y utilizado por Jem Roxette Carhuas Córdova (2016), adaptada por la autora del presente estudio. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: Los datos generales, prima la edad entre 15 a 20 años (33,3%), tienen dos hijos (35,9%) convivientes (48,7%), con estudios de secundaria (46,2%), amas de casa (76,9%). No existe relación significativa entre la edad materna, actividad laboral, grado de instrucción, estado civil y nivel de información sobre lactancia materna con el abandono de la LME según prueba chi cuadrado. No existe asociación entre los factores socioeconómicos (estado civil, el nivel educativo, la procedencia de la madre, el trabajo, ocupación y el ingreso económico) con el abandono de la LME según prueba estadística de Fisher. No existe asociación entre los factores culturales (conocimiento y creencias) con el abandono de la LME según prueba estadística de Fisher. La hipótesis del presente estudio al ser contrastada con los resultados encontramos que se cumple según lo planteado. Conclusiones: reciben sus hijos el 89,7% leche maternizada y el 10,3% lactancia materna exclusiva más agüita. Recomendaciones: Se deben fortalecer la intervención del personal de salud para limitar las malas prácticas en la alimentación del niño en los primeros seis meses, relacionadas con la LME tratarlo desde el control prenatal, atención del parto y puerperio, y en las estrategias de crecimiento y desarrollo.