

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



FACTORES DE RIESGO PARA FRACASO AL TRATAMIENTO
ANTITUBERCULOSO ESQUEMA SENSIBLE DE 6 MESES EN LA RED
DE SALUD PACIFICO NORTE 2015

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

GOMEZ ANGULO NORITA PILAR

CHIMBOTE

2016

Resumen

En el tratamiento para la Tuberculosis, existen factores de riesgo para fracaso al tratamiento de 6 meses del MINSA, que impiden la mejora de los pacientes y la persistencia de la enfermedad. El presente trabajo busca los factores de riesgo para fracaso al tratamiento del esquema sensible de los pacientes atendidos en la Red de Salud Pacífico Norte en el año 2015. Se realizó un trabajo de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. Se obtuvo la información a través de la Historia clínica de los pacientes seleccionados. Se realizó un análisis multivariado para la estimación de los factores de riesgo. La información se obtuvo utilizando el Software estadístico SPSS 23. Población: un total de 380 pacientes. Muestra: 37 casos de estudio. Resultados: La prevalencia para fracaso al tratamiento del esquema sensible 6 meses, fue de (9.74%) casos, los factores de riesgo para fracaso al tratamiento tuberculoso esquema sensible 6 en la Red de salud Pacífico Norte en el año 2015 fueron: El sexo masculino con (75.68%), la edad menor de 27 años con (48.65%), la irregularidad al tratamiento (46.25%), el factor socioeconómico con (37.84%) y el abandono al tratamiento con (29.37%), antecedentes patológicos (24.32%) pacientes con recaída temprana y contacto con caso índice con paciente TB resistente cada uno con (21.62%), contacto con persona que falleció por TB con (18.92%), continuando con los que presentaron RAFA y el trabajador o interno del penal cada factor con (10.8%), seguido de antecedentes de tratamientos previos y recaída luego del alta con medicamentos de segunda línea con (8.11%).