

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Medicina



“Periodo intergenesico prolongado como factor de riesgo para preeclampsia en gestantes, Hospital La Caleta, 2016”

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

SANTAMARIA SOLIS ELIANA STHEFANY

CHIMBOTE

2017

Resumen

El objetivo es determinar si el periodo intergenésico prolongado es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia en gestantes. El estudio es observacional retrospectivo y analítico. El estudio sigue un diseño de casos y controles, en el Hospital La Caleta de Chimbote, durante el año 2016. Se estudió a 90 gestantes, en donde se comparó 45 de ellas que tuvieron preeclampsia (casos) y 45 que no tuvieron dicha patología (45) a las cuales se les midió el periodo intergenésico prolongado (mayor de 48 meses). Se analizó el factor potencial asociado a preeclampsia usando la prueba de asociación Odd Ratio (OR). Se obtuvo como resultado que existe mayor riesgo de presentar preeclampsia en mujeres con periodo intergenésico prolongado (mayor a 48 meses), en las cuales se observó que un 75,6% presentaron este factor de riesgo, a diferencia de los controles que lo presentaron en un 48,9% (OR: 3.23, IC: 95%). Se llegó a la conclusión que el periodo intergenésico prolongado (mayor a 48 meses) es un factor de riesgo asociado a preeclampsia. Las mujeres que tienen este factor poseen un riesgo incrementado para que su embarazo sea complicado con preeclampsia.